

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ RENTGENOWSKICH

UROGRAFIA

W dniu poprzedzającym badanie:

- Śniadanie
- Obiad (tylko lekkostrawna zmiksowana zupa)
- Kolacja (do godz.17-tej)
- Wieczorem czopek Bisakodyl albo wlewka Enema
- Posiłki w dniu poprzedzającym badanie powinny być lekkostrawne.

W dniu badania:

- zgłosić się na czczo
- należy dostarczyć aktualny wynik stężenia kreatyniny we krwi

BADANIE DWUKONTRASTOWE JELITA GRUBEGO

W dniu poprzedzającym badanie:

- śniadanie
- obiad (tylko lekkostrawna zmiksowana zupa)
- od godz. 16⁰⁰ do wieczora wypić 3-4 litry roztworu Fortrans (opakowanie Fortransu zawiera 4 saszetki, każdą rozpuścić w 1 litrze wody)

W dniu badania (rano w domu)

- doodbytniczo wlewka Enema
- do badania należy zgłosić się na czczo
- leki należy przyjąć zgodnie z zaleceniem lekarza
- muszą upłynąć co najmniej 3 doby od ostatniego badania kontrastowego przewodu pokarmowego

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ RENTGENOWSKICH

ZDJĘCIE PRZEGLĄDOWE JAMY BRZUSZNEJ

W dniu poprzedzającym badanie pacjent powinien przyjąć wieczorem środek przeczyszczający. Na badanie zgłosić się na czczo, leki należy przyjąć zgodnie z zaleceniem lekarza.

BADANIE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO (ŻOŁĄDEK, PASAŻ)

Do badania należy zgłosić się na czczo, leki należy przyjąć zgodnie z zaleceniem lekarza- po za tym nie jest wymagane inne przygotowanie.

ZDJĘCIE RENTGENOWSKIE KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO/MIEDNICY

W przeddzień badania wieczorem zażyć środek przeczyszczający. W dniu badania zjeść lekkie śniadanie.

ZDJĘCIE RENTGENOWSKIE KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO/MIEDNICY

W przeddzień badania wieczorem zażyć środek przeczyszczający. W dniu badania zjeść lekkie śniadanie.

*Badania RTG pozostałych narządów
nie wymagają przygotowania*